



## LADY ANNA TEELTADVIES OOGST 2020

### De eigenschappen

|                    | Lady Anna               | Bintje     |
|--------------------|-------------------------|------------|
| Vroegrijpheid      | 6                       | 6,5        |
| Schilkleur         | lichtgeel               | geel       |
| Vleeskleur         | lichtgeel               | lichtgeel  |
| Knolvorm           | lang                    | lang ovaal |
| Regelmaat knolvorm | 7                       | 7          |
| Aantal knollen     | 14-17                   | 14-17      |
| Grootte knollen    | 7                       | 7          |
| Sortering          | 7,5                     | 7          |
| Opbrengst          | 102                     | 105        |
| Drogestof          | 106                     | 102        |
| Kiemrust           | 7                       | 5,5        |
| Loofontwikkeling   | trage beginontwikkeling | snel       |
| Loofeigenschap     | normaal                 | normaal    |
| Phytophthora loof  | 4                       | 3          |
| Phytophthora knol  |                         | 4,5        |
| Aardappelmoeheid   | Am A, BC, D             | vatbaar    |
| Schurft            | 7                       | 5          |
| Wratziekte         | resistent fysio 1       | geen       |

### Het planten

| Pootgoedssortering | plantafstand | hoeveelheid pootgoed per ha. |
|--------------------|--------------|------------------------------|
| 35/45 mm           | ca. 38-41 cm | 2.450 kg                     |
| 45/50 mm           | ca. 42-45 cm | 3.650 kg                     |

**Om de exacte hoeveelheid en plantafstand te bepalen houd rekening met het knolaantal per 25 kg!**  
Op zwaardere grond kleinste plantafstand aanhouden.

Lady Anna heeft een lange kiemrust, laat het pootgoed voor het poten acclimatiseren en goed los komen. Poten in het "witte puntjes stadium" geeft goede resultaten. Kiemen niet mechanisch of chemisch beschadigen. Geadviseerd wordt het pootgoed altijd tegen Rhizoctonia te behandelen.

Niet te vroeg poten in koude grond. Lady Anna heeft een trage beginontwikkeling, door geduld te bewaren in het voorjaar kan het gewas gemakkelijker in één keer door groeien.

Niet te diep planten, onderkant potter op het maaiveld. Lady Anna groeit diep in de rug.

## De bemesting

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stikstof</b>  | Totaal +/- 275 kg per ha incl. bodemvoorraad. Lady Anna heeft een hoge stikstofbehoefte vooral tijdens beginontwikkeling. Deelgift wordt aanbevolen 200 kg voor het poten. 1 <sup>e</sup> overbemesting 50kg na de knolzetting, wanneer knollen een doorsnede van 10mm hebben. Laatste stikstof overbemesting 25kg om Lady Anna aan de groei te houden. |
| <b>Fosfaat</b>   | volgens advies bodemonderzoek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Kali</b>      | Volgens bodemonderzoek, na januari chloorarme kali inzetten. Verse chloorarme kali is aan te bevelen i.v.m. de blauwgevoeligheid.<br>Aan te bevelen is 300 kg zuivere kali.                                                                                                                                                                             |
| <b>Mangaan</b>   | Mangaan en Magnesium zorgen voor een vitaal gewas en wordt geadviseerd om vroegtijdige afrijping van het gewas te voorkomen.                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Magnesium</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## De gewasbescherming

- Lady Anna lijkt Sencor als onkruidbestrijdingsmiddel te verdragen. Voorkeur gaat uit naar een vooropkomst toediening van Sencor.
- Op tijd beginnen met de Phytophthorabestrijding, eerste bespuiting vanaf 80% opkomst. Vanaf begin augustus bespuitingen uitvoeren met een knolbeschermend middel.
- Alternaria bestrijding op juiste wijze uitvoeren.

## De oogst en bewaring

- Na doodspuiten is het belangrijk de aardappelen voldoende af te laten harden i.v.m. grote knollen > +/- 3 weken.
- Voorzichtig rooien i.v.m. rooibeschatiging.
- Gebruik valbrekers in de kipper en beperk de valhoogtes tot een minimum.
- Condensvorming in de bovenlaag dient voorkomen te worden.
- Ventileer kort maar regelmatig om CO<sub>2</sub>ophoping te voorkomen.
- Bewaartemperatuur: Geleidelijk inkoelen naar stabiele bewaartemperatuur van ca. 7°C.
- Geschikt voor midden lange/ lange bewaring.

## Teler:

Perceelsgericht advies / aandachtspunten:

Bij twijfel of vragen over de teelt kunt u altijd uw teeltadviseur raadplegen!